

# SEKSUALNO PRENOSIVE BOLESTI

	NAZIV	KRATAK OPIS SIMPTOMA		OD DIJAGNOZE DO IZLEČENJA
		KOD MUŠKARACA	KOD ŽENA	
BAKTERIJE	<b>Infekcije izazvane hlamidijama i mikoplazmama</b> Često se javljaju. Izazivači su <i>Chlamydia trachomatis</i> , odnosno <i>Mycoplasma hominis/Ureaplasma urealyticum</i> . Ne tako retko javlja se udružena infekcija ovim mikroorganizmima.	Umerena sekrecija ujutru iz mokraćnog kanala (obično u vidu jedne kapi). Osećaj peckanja ili žarenja u mokraćnom kanalu.	Vrlo često nema nikakvih simptoma. Ponekad se javlja vaginalna sekrecija, bolovi u donjem delu trbuha, prilikom seksualnog odnosa, "upala jajnika", genitalna krvarenja, peckanje prilikom mokrenja. Obično se slučajno otkrije prilikom rutinskog pregleda.	Dijagnoza se postavlja uzimanjem uzorka sa genitalija i uzimanjem krvi. Lečenje antibioticima svih seksualnih partnera. Ako se lečenjem ne počne na vreme, postoji visok rizik od komplikacija, pa se može javiti i sterilitet zbog oštećenja unutrašnjih genitalija.
	<b>Gonorrhoea (gonereja, triper, kapavac)</b> Prouzrokovao je bakterija <i>N. gonorrhoeae</i> . Posle kontakta sa zaraženom osobom i relativno kratke inkubacije (prosečno 7 dana) dolazi do pojave tegoba.	Žut, gnojav sekret iz mokraćnog kanala, sa pečenjem prilikom mokrenja. Ponekad simptomi mogu da budu minimalni.	Oskudni simptomi- peckanje prilikom mokrenja, ponekad bez ikakvih simptoma. Javlja se i vaginalna sekrecija.	Dijagnoza se postavlja uzimanjem uzorka sa genitalija. Lečenje antibioticima svih seksualnih partnera. Ako se ne leči postoji rizik od komplikacija (steriliteta naročito) usled oštećenja unutrašnjih genitalija.
	<b>Syphilis (sifilis)</b> Izaziva ga bakterija <i>Treponema pallidum</i> (bleda piroheta).	Ranice: bezbolne ranice na genitalnim organima (ili u ustima, ili na anusu), koje često prati otok regionalnih limfnih čvorova, koji su tvrdi ali bezbolni. Ružičaste pege na koži ili ploče u ustima ili na genitalijama u drugom stadijumu oboljenja. Ove ranice često se ne primećuju- u tom slučaju dijagnoza se može postaviti samo uzimanjem krvi.		Dijagnoza se postavlja uzimanjem uzorka oko ranice, pre započinjanja lečenja i uzimanjem krvi. Leči se antibioticima. Nelečenje, tj. neadekvatno lečenje uzimanjem nedovoljnih doza antibiotika "na svoju ruku", dovodi do ozbiljnih komplikacija, posebno na nervnom i kardiovaskularnom sistemu i više godina nakon infekcije. Potraga za zaraženim seksualnim partnerima.
VIRUSI	<b>Genitalni herpes</b> Veoma je čest a prouzrokuje ga virus <i>herpesa</i> .	Male ranice na genitalnim organima, često brojne i bolne. Prethodi im pojava sitnih plikova, svrab, peckanje, a kada se jave prvi put (primarni herpes) i drhtavica, jeza, povišena temperatura. Ove ranice se pojavljuju periodično, traju nekoliko dana, a zatim nestaju do sledećeg pojavljivanja.		Dijagnoza se postavlja uzimanjem uzorka oko ranice, pre započinjanja lečenja i uzimanjem krvi. Leči se antiviralnim lekovima. U slučaju da trudnica boluje od genitalnog herpesa postoji velika opasnost od infekcije za dete prilikom porođaja.
	<b>Genitalni kondilomi</b> Veoma su česti a izazivaju ih <i>Humani papiloma virusi</i> (ima ih preko 50).	Penis i anus. Javljaju se kao male izrasline u obliku bradavica, ili su nevidljivi golim okom i ne prouzrokuju nikakve simptome.	Javljaju se u predelu genitalija.	Potražiti zaražene partnere. Dijagnoza se potvrđuje specijalističkim pregledom (kolposkopijom kod žena). Lokalno lečenje treba da traje do uklanjanja vidljivih promena. O momentu završetka lečenja odlučuje lekar. Kod žena koje nisu lečene postoji mogućnost razvoja raka grlića materice.
	<b>Hepatitis B</b> Često oboljenje koje izaziva virus <i>Hepatitis B</i> (HBV).	Ne manifestuje se u predelu genitalija. Najčešće ne daje simptome. Ponekad se javlja žutica, umor, razni digestivni simptomi. Napomena: hepatitis C takođe može da se prenese seksualnim putem.		Dijagnoza se postavlja uzimanjem krvi. Hepatitis B može postati hronično oboljenje, kada se javlja rizik da dovede do ciroze i/ili raka jetre. Postoji vakcina koja štiti osobe koje nisu inficirane.
PARAZITI	<b>Trichomoniasis (trihomonijaza)</b> Prouzrokovana parazitom <i>Trichomonasvaginalis</i>	Često ne daje nikakve simptome. Ponekad tečnost koja curi iz mokraćnog kanala i svrab.	Vaginalni sekret neprijatnog mirisa, pečenje i svrab.	Dijagnoza se postavlja uzimanjem sekreta. Lečenje metronidazolom.
GLJIVICE	<b>Candidiasis (genitalna kandidijaza)</b> Veoma često oboljenje, naročito kod žena. Prouzrokovatelj je <i>Candida albicans</i> .	Crvenilo glavića sa sitnim beličastim naslagama.	Vaginalna sirasta sekrecija praćena svrabom, ili intenzivnim pečenjem.	Banalna infekcija, ali neugodna uz mogućnost ponovnog javljanja (recidivi). Dijagnoza se postavlja mikroskopskim pregledom vaginalnog sekreta, odnosno brisa glavića. Lokalno lečenje je najčešće dovoljno. Osobama sa upornom infekcijom koja ne reaguje na terapiju savetuje se kontrola nivoa šećera u krvi.